

ВНАТРЕШНО УПАТСТВО: ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЕНТИ

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи важни информации за вас.

Овој лек се издава без рецепт за ублажување на полесни здравствени проблеми за кои не е потребен совет од лекар. И покрај тоа, лекот треба да го употребувате внимателно за да ви биде што повеќе од корист.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Советувајте се со вашиот фармацевт ако ви се потребни дополнителни информации.
- Ако симптомите на вашата болест не се подобрат или се влошат по 6 недели при хронична венска болест или по 7 дена во случај на акутни хемороиди, тогаш мора да појдете на лекар.

Во ова упатство:

1. Што претставува Флебавен и за што се употребува
2. Што треба да знаете пред да го земете Флебавен
3. Како да го земате Флебавен
4. Можни несакани дејства
5. Чување и рок на употреба на Флебавен

Flebaven – Флебавен 1000 mg таблети Diosmin

- **Активни супстанции:** диосмин. Секоја таблета содржи 1000 mg микронизиран диосмин.
- **Помошни супстанции:** поливинил алкохол, кроскармелоза натриум и магнезиум стеарат.

Таблетите Флебавен се малку биконвексни, овални таблети со бледо зеленикава или сивкасто-жолта до бледо зеленикава или мермерна сивкасто-кафена боја. Таблетата има овална форма со димензии 18,0 mm × 9,0 mm.

Флебавен е достапен во пакувања со 30 таблети во блистери.

Име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет:

КРКА-ФАРМА ДООЕЛ Скопје, ул. Христо Татарчев-1, број 101, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Име и адреса на производителот:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словенија

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА ФЛЕБАВЕН И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Диосмин и припаѓа на групата на супстанции наречени биофлавоноиди и се користи за стабилизација на капиларите. Флебавен содржи активни супстанции кои влијаат на активноста на вените и ги заштитуваат вените. Тие ја зголемуваат еластичноста (тонусот) на вените и капиларниот отпор. Флебавен ја намалува појавата на отоци (едеми) и има против-воспалителни дејства.

Флебавен е наменет за употреба кај возрасни лица за лекување на знаци и симптоми на хронична венска болест, како што се болка, чувство на тежина во нозете, замор во нозете, немирни нозе, ноќни грчеви, оток (едем) и трофични промени. Исто така, Флебавен се употребува и за лекување на симптоми поврзани со акутни хемороиди, како што се болка, крварење и оток во аналниот регион.

Ако го земате Флебавен за лекување на симптомите на хронична венска болест, мора да се



советувате со вашиот лекар или фармацевт ако не се чувствувате подобро или ако се чувствувате полошо по 6 недели од терапијата.

Ако го земате Флебавен за лекување на симптомите на акутни хемороиди, мора да се советуваат со вашиот лекар или фармацевт ако не се чувствувате подобро или ако се чувствувате полошо по 7 дена од терапијата.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО ЗЕМАТЕ ФЛЕБАВЕН

Немојте да го земате Флебавен:

- ако сте алергични на диосмин или на некоја од помошните супстанции на Флебавен (наведени погоре во текстот).

Бидете особено внимателни со Флебавен

Советувајте се со вашиот лекар пред да започнете да го земате Флебавен.

Хронична венска болест

Ако вашата состојба се влоши за време на лекувањето, што може да се манифестира како воспаление на кожата или вените, стврднување на ткивото под кожата, силна болка, појава на чиреви на кожата или невообичаени симптоми како што се ненадејно отекување на едната или двете нозе, треба веднаш да се советуваат со вашиот лекар.

Лекувањето со Флебавен е најкорисно кога е придружено со урамнотежен стил на живот:

- треба да се избегнува изложување на сонце и долго стоење,
- треба да се одржува соодветна телесна тежина,
- носењето на специјални чорапи може да ја подобри циркулацијата кај некои пациенти.

Флебавен нема да помогне во намалувањето на отокот на долниот дел на екстремитетите, ако отокот е предизвикан од некое заболување на срцето, бубрезите или на црниот дроб.

Акутни хемороиди

Во случај на акутни хемороиди, Флебавен може да го земате само за ограничен временски период од 15 дена. Ако симптомите не се повлечат во овој временски период, треба да се советуваат со вашиот лекар.

Ако состојбата ви се влоши за време на терапијата, односно ако забележите зголемено крварење од ректумот, крв во столицата или се сомневате на крварење од хемороидите, треба да се советуваат со вашиот лекар.

Терапијата со Флебавен не е замена за специфичната терапија на други анални нарушувања.

Деца и адолесценти

Не се препорачува употреба на Флебавен кај деца и адолесценти.

Ве молиме да се посоветуваат со лекар и тогаш кога горенаведените укажувања се однесуваат на вас, било кога во минатото.

Земање на други лекови со Флебавен

Ве молиме да го информирате вашиот лекар или фармацевт ако земате или ако неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.
Досега не се пријавени интеракции на диосмин со други лекови.

Земање на лекот Флебавен со храна и пијалок

Флебавен треба да го земате заедно со оброците.

Бременост и доене



Советувајте се со вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек.

Безбедноста на употребата на Флебавен за време на бременост и доење не е утврдена. Поради тоа, не се препорачува употреба на Флебавен за време на бременоста и доењето.

Ако сте бремени или доите, мислите дека сте бремени или планирате да забремените, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек.

Влијание врз способноста за возење или за ракување со машини

Флебавен нема влијание или има незначително влијание врз способноста за возење или за ракување со машини.

3. КАКО ДА ГО ЗЕМАТЕ ФЛЕБАВЕН

Строго придржувајте се кон упатствата на лекарот. Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го прекинете без да се посоветувате со лекар.

Дозирање

Хронична венска болест

Препорачана дневна доза е 1 таблета.

Овој лек мора да го земате најмалку 4 до 5 недели за да забележите подобрување. Ако симптомите на вашата болест се влошат или ако не се подобрат по шест недели од терапијата, треба да се советувате со вашиот лекар.

Самостојното лекување без советување со лекар може да трае 3 месеци. Сепак, може да продолжите да го земате Флебавен подолго време, ако вашиот лекар утврди дека не ви е потребно друго специфично лекување.

Акутни хемороици

Препорачана дневна доза во првите 4 дена од лекувањето е 3 таблети. Во следните 3 дена, препорачана дневна доза е 2 таблети.

Потоа, се препорачува доза на одржување од 1 таблета дневно.

Ако симптомите не се подобрат или ако се влошат по 7 дена од терапијата, треба да се консултирате со вашиот лекар. Самостојното лекување со Флебавен може да трае 15 дена. Ако симптомите не се повлечат во рамки на овој период, треба да се советувате со вашиот лекар.

Начин на употреба

Флебавен треба да се зема заедно со оброците.

Голтнете ја таблетата со малку течност.

Ако имате впечаток дека дејството на Флебавен е премногу силно или премногу слабо, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Ако сте земале поголема доза од Флебавен отколку што треба

Ако сте земале поголема доза од Флебавен отколку што треба, веднаш треба да се советувате со вашиот лекар или фармацевт.

Досега не се пријавени случаи на предозирање со диосмин.

Ако сте заборавиле да го земете Флебавен

Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената.

Доколку имате дополнителни прашања за употребата на овој лек, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.



4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите лекови, така и Флебавен може да има несакани дејства иако не кај сите болни. Несаканите дејства кои се пријавени при употребата на диосмин вклучуваат:

Чести несакани дејства (може да се појават кај најмногу 1 на 10 пациенти)

- Пролив, нарушено варење, гадење (чувство на непријатност), повраќање.

Помалку чести несакани дејства (може да се појават кај најмногу 1 на 100 пациенти)

- Колитис (воспаление на дебелото црево).

Ретки несакани дејства (може да се појават кај најмногу 1 на 1,000 пациенти)

- Главоболка, малаксаност (не се чувствуваат добро), вртоглавица (чувство на вртење),
- Исип, чешање, уртикарија.

Непознати (честотата не може да се пресмета од достапните податоци)

- Болки во stomакот.
- Едем (отекување на лицето, усните и очните капаци) и во ретки случаи појава на ангиоедем (брзо отекување на ткивата, како што се лицето, усните, јазикот или грлото, што може да резултира со отежнато дишење).

Пријавување на несакани дејства

Ако забележите било какви несакани дејства, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт. Ова вклучува било какви несакани дејства кои не се спомнати во ова упатство. Со пријавување на несакани дејства помагате во овозможување на повеќе информации во врска со безбедноста на овој лек.

Ако забележите било какви несакани дејства кои не се спомнати во ова упатство, ве молиме да го информирате вашиот лекар или фармацевт.

5. ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА ФЛЕБАВЕН

Начин на чување

Лекот чувајте го на места недостапни за деца!

Да се чува на температура до 25°C.

Да се чува во оригиналното пакување за да се заштити од влага.

Рок на употреба

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на пакувањето.

Рокот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

Лековите не треба да се фрлаат со отпадоците од домаќинството. Советувајте се со вашиот фармацевт како да ги отстраните лековите кои повеќе не ви се потребни. Овие мерки помагаат во заштитата на животната средина.

Начин на издавање на лекот

Лекот може да се издава во аптека без рецепт.

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Ноември 2022

